



จะอย่างไรหากถูกสุนัข
หรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรค
พิษสุนัขบ้ากัด

การเก็บรักษาวัคซีน



วัคซีนจะต้องเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 2 -8 องศา

ไม่นำวัคซีนไปแช่แข็ง
หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่
นำวัคซีนมาวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น



หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัส
กับแสงแดด

กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุ
ลงในกล่อง รักษาความเย็น
หรือกระป๋องวัคซีน ที่
สามารถรักษาความเย็นให้
อยู่ในระดับ 2 - 8 องศา
เซลเซียส



วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับ
น้ำแข็งโดยตรง ต้องนำไป
ใส่ถุงพลาสติก หรือภาชนะ
บรรจุที่ป้องกันการสัมผัสน้ำ
โดยตรงก่อนบรรจุลงใน
กล่องรักษาความเย็น



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน



โทร 0450429344



สอบถามเพิ่มเติม ว่าที่ ร.ต หญิง นวรัตน์ เจริญรอย

โทร 0956872299



โรคพิษสุนัขบ้า รู้ไว้...ป้องกันได้



1

รีบล้างบริเวณแผล
ด้วย สบู่ น้ำ



2

รีบไปพบแพทย์เพื่อ
การวินิจฉัยและฉีด
วัคซีนป้องกันโรคให้
ทันทันที



3

รีบกักสัตว์ เพื่อเฝ้า
ระวังและติดตาม
อาการ



ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

รักน้องหมา

อย่าลืมนำน้องไป **ฉีดวัคซีน**

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะจะ



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร?



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS)

สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง

สัตว์ที่สามารถเป็นโรคที่สุนัขมาได้คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งในประเทศไทยพบการเกิดโรคใน สุนัขมากที่สุด



โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากทางไหนได้บ้าง

เชื้อไวรัสออกมาพร้อมกับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือข่วน หรือเข้าทางเยื่อตา ปาก จมูก ที่มีแผลหรือรอยฉีกขาด ซึ่งซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย



เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิดอาการภายในกี่วัน



ไม่แน่นอนระยะเวลาการเกิดโรคขึ้นอยู่กับปริมาณที่โดนกัด ว่าใกล้เส้นประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาหายได้หรือไม่



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิตเท่านั้น หรือสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน



สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกที่อายุ 12 สัปดาห์ เข็มที่สองหลังจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกเดือน



อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม ซึ่งซึ่งดุร้ายจะสามารถสังเกตได้ชัดคือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่เงียบเงียบแสดงอาการทางระบบประสาท กระวนกระวาย กระแทกสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่เลือกเลือกหน้า คางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก



ดุร้าย



ซึม

โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะหน้าร้อนใช่หรือไม่



ไม่ใช่

โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี